

Les larves de carpocapsa es concentren més a les pomeres petites i frondoses

Les larves de la carpocapsa o corc de les pomes i les peres (*Cydia pomonella* [<https://ca.wikipedia.org/wiki/Carpocapsa>]) tendeixen a concentrar-se en els arbres més petits i frondosos, segons una recerca de la Universitat de Lleida (UdL) i Agrotecnio. La relació entre la densitat de la **capçada** [<https://ca.wikipedia.org/wiki/Cap%C3%A7ada>] i l'impacte d'aquests insectes pot ajudar els pagesos a ajustar les dosis de fitosanitaris, a l'igual que els mapes de plagues també contribuirien a establir noves estratègies de gestió sostenible. Així ho determinen els darrers estudis del Grup de Recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió (GRAP [</sites/Grap/ca/>]) publicats a *Precision agriculture '25* [<https://brill.com/edcollbook-oa/title/71932>]. [Ampliar notícia] [<https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Les-larves-de-carpocapsa-es-concentren-mes-a-les-pomeres->]



Text: Premsa UdL

M É S

N o t í c i a

A g r o t e c n i o

[<https://agrotecnio.org/ca/2025/10/08/els-mapes-de-plagues-i-la-mida-de-la-capcada-de-larbre-possibles-factors-clau-per-frenar-la-plaga-d>]

Article *Spatio-temporal pattern analysis of the codling moth *Cydia pomonella* at plot scale: does location of monitoring traps matter?* [<https://brill.com/edcollchap-oa/book/9789004725232/BP000029.xml>]

Article *Pest-canopy interaction at plot level as a new driver for variable-rate pesticide applications* [<https://brill.com/edcollchap-oa/book/9789004725232/BP000033.xml>]

I N F O R M A C I Ó :

